



LEMBAR PENGESAHAN
Nomor: 95/LP-LPBK/III/2025

Judul : Gambaran Kualitas Hidup Caregiver Pasien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Wiradesa

Nama : Iftah Olivia Putri Riskiani

Menerangkan bahwa abstrak ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Lembaga Pengembangan Bahasa dan Kerja Sama (LPBK), Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan.

Pekalongan, 24 Maret 2025

Disahkan oleh,
Kepala Lembaga Pengembangan Bahasa dan Kerja Sama (LPBK)

Aida Rusmariansa, S.Kep., Ns., MAN *aus*

**Program Studi Sarjana Keperawatan
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
Februari, 2025**

ABSTRAK

Iftah Olivia Putri Riskiani¹, Aisyah Dzil Kamalah²

Gambaran Kualitas Hidup *Caregiver* Pasien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Wiradesa

Latar Belakang: Skizofrenia adalah penyakit jangka panjang yang membutuhkan perawatan dari *caregiver*. Perawatan ini seringkali berat secara fisik, emosional, dan finansial, yang dapat menurunkan kualitas hidup pengasuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas hidup *caregiver* pasien skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Wiradesa.

Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik *simple random sampling*. Sampel terdiri dari 100 *caregiver* yang merawat pasien skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Wiradesa. Instrumen penelitian yang digunakan menggunakan kuesioner *The Schizoprhrenia Caregiver Quality of Life* (S-CGQoL). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis univariat berupa distribusi frekuensi dan persentase.

Hasil: Usia rata-rata responden 47,33 tahun dengan lama merawat pasien skizofrenia 12 tahun 10 bulan. Kebanyakan responden berjenis kelamin perempuan (72,0%), berpendidikan SD (42,0%), dan berpenghasilan <UMR (<Rp.2. 545.138) (59,0%). Sebanyak (38,0%) responden tidak bekerja, (82,0%) sudah menikah, dan (57,0%) memiliki hubungan sebagai saudara dengan pasien. Pasien skizofrenia rata-rata lama sakitnya 15 tahun 0 bulan. Kebanyakan pasien skizofrenia berjenis kelamin laki-laki (55,0%) dan berstatus berobat (68,0%). Kualitas hidup responden masih terdapat kategori kualitas hidup buruk (12,0%).

Simpulan: Masih terdapat kualitas hidup *caregiver* buruk, dapat dipengaruhi oleh faktor *caregiver* dan pasien skizofrenia. Saran bagi pihak pelayanan kesehatan untuk memantau dan memberikan dukungan guna meningkatkan kualitas hidup *caregiver* dalam merawat pasien skizofrenia.

Kata Kunci: *Kualitas Hidup, Caregiver Skizofrenia, Skizofrenia*

Daftar Pustaka: 50 (2011-2024)

ABSTRACT

Iftah Olivia Putri Riskiani¹, Aisyah Dzil Kamalah²

Overview of the Caregivers' Life Quality of Schizophrenia Patients in the Wiradesa Health Center Work Area

Background: Schizophrenia is a long-term illness that requires care from a caregiver. This care is often physically, emotionally, and financially demanding, potentially reducing the caregiver's quality of life. The research aimed to determine how caregivers' life quality of schizophrenia patients in the Wiradesa Health Center Work Area

Method: the research applied quantitative descriptive research design with a simple random sampling technique. The sample consisted of 100 caregivers who care for schizophrenia patients in the Wiradesa Health Center Work Area. The Schizophrenia Caregiver Quality of Life (S-CGQoL) questionnaires were applied as the instrument. Furthermore, the collected data were analyzed using univariate analysis in the form of frequency distribution and percentage.

Result: The average age of respondents was 47.33 years with a length of care for schizophrenia patients of 12 years 10 months. Most respondents were female (72.0%), had elementary school education (42.0%), and had income <UMR (<Rp.2,545,138) (59.0%). In other hand, as many as (38.0%) respondents were unemployed, (82.0%) were married, and (57.0%) were related to the patient as siblings. The average duration of illness for schizophrenia patients is 15 years and 0 months. Most schizophrenia patients are male (55.0%) and are receiving treatment (68.0%). The respondents' quality of life is still in the poor quality of life category (12.0%).

Conclusion: There is still poor quality of life of caregivers, which can be influenced by factors of caregivers and schizophrenia patients. Therefore, for health service providers, it is recommended to monitor and provide support to improve the quality of life of caregivers in caring for schizophrenia patients.

Keywords: *life quality, Caregiver Schizophrenia, Schizophrenia*

References: 50 (2011-2024)