

Penerapan Terapi Murottal Untuk Menurunkan Nyeri Pada Klien Post Operasi Fraktur Di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Novita Andriani, Firman Faradisi

Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Abstrak

Di negara berkembang seperti Indonesia, patah tulang adalah penyebab kematian terbesar ketiga setelah penyakit jantung dan tuberkulosis. Salah satu penatalaksanaan untuk pasien fraktur adalah fraktur adalah pembedahan, dan pembedahan dapat menyebabkan rasa sakit. Salah satu cara untuk mengatasi rasa sakit pada pasien fraktur pasca operasi adalah Terapi Murottal, yaitu dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an selama lima belas menit. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menganalisis aplikasi terapi Murottal pada nyeri pasca operasi. Subjek dalam studi kasus ini melibatkan dua pasien fraktur pasca operasi yang diberi Terapi Murottal selama tiga hari. Hasil aplikasi ini menunjukkan bahwa Terapi Murottal dapat berpengaruh atau efektif dalam mengurangi skala nyeri pada pasien fraktur. Berdasarkan hal ini, perawat dapat mengajarkan Terapi Murottal kepada pasien dan pasien dapat menggunakan terapi untuk mengurangi rasa sakit.

.

Kata Kunci : Fraktur, Nyeri, Terapi Murottal

The Application Of Murottal Therapy To Reduce Pain In Post Fracture Surgery In Muhammadiyah Islamic Hospital Pekajangan Pekalongan

Novita Andriani, Firman Faradisi

Nursing Diploma Three Study Program, Faculty of Health Sciences, University of Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Abstract

In developing countries like Indonesia, fracture is the third largest cause of death after coronary heart disease and tuberculosis. One of the management for the fracture patients is the fracture surgery, and surgery can cause pain. One of the ways to deal with pain in postoperative fracture patients is Murottal Therapy, which is by listening to the verses of the Al-Qur'an for fifteen minutes. The purpose of this case study was to analyze the application of Murottal therapy on pain post surgery. Subjects to this case study involved two postoperative fracture patients who were given Murottal Therapy for three days. The results of this application indicate that Murottal Therapy can be influential or effective in reducing pain scale in fracture patients. Based on this, the nurses can teach Murottal Therapy to patients and patients can use therapy to reduce pain.

Keywords : *Fracture, Pain, Murottal Therapy*