

ABSTRAK

Abdul Muhaji, Irnawati

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Putus Obat Pasien Tuberkulosis Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Pekalongan

Latar Belakang: Pasien tuberkulosis paru sering menghentikan pengobatan sebelum waktunya. Hal ini menyebabkan peningkatan infeksi, resistensi obat, dan kematian. Banyak faktor yang menyebabkan pasien tuberkulosis putus berobat, salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan tentang penyakit mempengaruhi keinginan pasien untuk berobat secara teratur.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Putus Obat Pasien Tuberkulosis di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Pekalongan.

Sampel: Penelitian ini melibatkan 8 partisipan dari 23 pasien putus obat tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Pekalongan.

Metode: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang disajikan melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) berupa gambaran deskriptif dengan analisa data menggunakan teknik sembilan langkah Colaizzi (1978).

Hasil: Penelitian ini didapatkan lima faktor yang berhubungan dengan kejadian putus obat pasien tuberkulosis yaitu: 1) Pengetahuan, 2) Efek samping, 3) Motivasi, 4) Dukungan keluarga, 5) Pengawasan menelan obat.

Simpulan: Pasien putus berobat dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengetahuan, adanya efek samping obat, motivasi yang rendah, dukungan keluarga yang kurang baik, dan tidak adanya pengawasan menelan obat.

Kata kunci : Tuberkulosis Paru, Putus Berobat, Pengetahuan, Efek Samping Obat, Motivasi, Dukungan Keluarga, Pengawasan Menelan Obat.

Daftar pustaka : 54 (2013-2022)

ABSTRACT

Abdul Muhaji¹, Irnawati²

Factors Associated with Discontinuation of Tuberculosis Patients in the Work Area of the Pekalongan District Health Center

Background: Pulmonary tuberculosis patients often stop treatment prematurely. It causes increased infection, drug resistance, and mortality. Many factors cause patients to do this, including a lack of knowledge about the disease.

Objective: this study aims to obtain an in-depth understanding of the factors associated with the discontinuation of Tuberculosis patients in the work area of the Pekalongan District Health Center.

Sample: it involved 8 participants from 23 patients with tuberculosis drug withdrawal.

Method: It is a qualitative with a phenomenological approach which is presented through an in-depth interview method in the form of a descriptive picture with data analysis using the nine-step technique of Colaizzi (1978).

Result: it stated there are five factors associated with the discontinuation of Tuberculosis patients; (1) knowledge, (2) side effects, (3) motivation, (4) family supports, and (5) drug taking control.

Conclusion: Patients who drop out of treatment are influenced by several factors, including lack of knowledge, side effects of drugs, low motivation, poor family support, and no supervision of swallowing drugs.

Keywords: *Pulmonary Tuberculosis, discontinuation, knowledge, side effects, motivation, , family support, drug taking control*

References: 54 (2013-2022)