

ABSTRAK

Hubungan Pengabaian Dengan Tingkat Depresi Pada Lansia Yang Tinggal di Panti

Lili Wulandari, Sugiharto

Latar Belakang: Masalah psikologis yang sering terjadi pada lansia adalah pengabaian dimana kondisi yang terkait dengan kegagalan pengasuh dalam memenuhi kebutuhan kesehatan fisik dan mental individu dalam memberikan layanan yang dibutuhkan oleh lansia. Masalah kesehatan pada lansia berhubungan dengan adanya penurunan fungsi fisik. Kurangnya kemampuan dalam beradaptasi secara psikologis terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya, mengakibatkan seringkali terjadi permasalahan psikososial pada lansia, salah satunya depresi.

Metode: Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelatif dengan pendekatan cross-sectional, dengan menggunakan kuesioner Psychological Elder Abuse Scale (PEAS) dan kuesioner Geriatric Depression Scale (GDS). Populasi dalam penelitian ini adalah 63 responden dan diperoleh sampel 47 responden. Penelitian ini Uji Spearman Rank dengan menggunakan teknik total sampling

Tujuan: Untuk mengetahui Hubungan Pengabaian Keluarga dengan Tingkat Depresi Pada Lansia yang tinggal Di Panti.

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan responden dengan pengabaian psikologi diketahui rata-rata 2,98 dengan skor terendah 0 dan tertinggi 7 dan diketahui tingkat depresi diketahui rata-rata 7,49 dengan skor terendah 5 dan tertinggi 12. Hasil analisis data dengan korelasi Person diperoleh p value $0,194 < 0,05$ dengan kekuatan hubungan pengabaian psikologi dengan tingkat depresi pada lansia diperoleh $r: 0,193$ yang berarti kekuatan lemah.

Simpulan: Tidak terdapat hubungan pengabaian psikologi dengan tingkat depresi pada lansia yang tinggal di panti.

Kata kunci : Pengabaian Psikologi, Tingkat Depresi,
Lansia Daftar Pustaka : 46 Jurnal (2012-2022)

**Undergraduate Program in Nursing
Faculty of Health Science
University of Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan**

ABSTRACT

Lili Wulandari¹, Sugiharto²

The Correlation between Neglect and Depression Levels of the Elderly Who Lived in Residential Care

Background: When caregivers fail to provide services that meet the physical and mental health needs of the elderly, the psychological problem that often occurs is elderly neglect. Health problems in the elderly are related to a decrease in physical function. Lack of ability to adapt psychologically to the changes often results in psychosocial problems in older people. One of which is depression.

Method: This study used a correlative descriptive design with a cross-sectional approach, using the Psychological Elder Abuse Scale (PEAS) questionnaire and the Geriatric Depression Scale (GDS) questionnaire. The population in this study was 63 respondents and the sample was 47 respondents. This study used the Spearman Rank Test with a total sampling technique.

Objective: To determine the correlation between family neglect and depression levels in elderly people living in residential care.

Result: The results of this study showed that respondents with psychological neglect had an average score of 2.98 with the lowest score of 0 and the highest of 7. Their level of depression had an average score of 7.49 with the lowest score of 5 and the highest of 12. The results of the data analysis with Pearson correlation showed a p-value of 0.194 >0.05 with the strength of the correlation between psychological neglect and the level of depression in the elderly was $r = 0.193$ which meant weak.

Conclusion: There is no correlation between psychological neglect and the level of depression in elderly people living in the residential care.

Keywords: *psychological neglect, level of depression, elderly*

Bibliography: 46 Journals (2012-2022)