



LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Penerapan Perawatan Tali Pusat Terbuka Untuk Mempercepat Pelepasan Tali Pusat

Nama : Rahma Ayu Safitri

Menerangkan bahwa abstrak ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris oleh Lembaga Pengembangan Bahasa dan Kerja Sama (LPBK), Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan.

Pekalongan, 12 Juli 2024

Disahkan oleh,
Kepala Lembaga Pengembangan Bahasa dan Kerja Sama (LPBK)

Aida Rusmariana, S.Kep., Ns., MANA

ABSTRAK

Rahma Ayu Safitri¹, Isyti'aroh²

Penerapan Perawatan Tali Pusat Terbuka Untuk Mempercepat Pelepasan Tali Pusat

Perawatan tali pusat yang tidak tepat dapat menyebabkan waktu pelepasan tali pusat lebih lama bahkan infeksi tali pusat. Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan perawatan tali pusat terbuka untuk mempercepat pelepasan tali pusat. Metode karya tulis ilmiah ini menggunakan rancangan studi kasus untuk melihat waktu pelepasan tali pusat dengan perawatan tali pusat terbuka. Frekuensi pemberian intervensi dua kali dalam sehari. Subjek studi kasus ini yaitu 2 bayi baru lahir dengan kondisi tali pusat belum terlepas. Penerapan dilakukan dari hari pertama kelahiran sampai dengan tali pusat terlepas. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa bayi pertama terlepas pada hari ke-3 dan bayi kedua terlepas pada hari ke-4. Kesimpulan dari studi kasus bahwa perawatan tali pusat dengan metode terbuka dapat mempercepat pelepasan tali pusat. Saran bagi ibu yang mempunyai bayi baru lahir dapat menerapkan perawatan tali pusat terbuka.

Kata kunci *Bayi baru lahir, Perawatan, Tali pusat*

ABSTRACT

Rahma Ayu Safitri¹, Isyti'aroh²

The Application of Open Umbilical Cord Care to Accelerate Cord Separation

Improper care of the umbilical cord can prolong the time it takes for the cord to detach and may even lead to umbilical cord infections. This scientific paper aims to describe the application of open umbilical cord care to accelerate umbilical cord separation. The method employed in this scientific paper uses a case study design to observe the time taken for umbilical cord separation with open umbilical cord care. The intervention was applied twice daily. The subjects of this case study were two newborn babies with umbilical cords yet to detach. The application started from the first day after birth until the cord separated. Results from the case study show that the umbilical cord of the first baby separated on day 3, while the umbilical cord of the second baby separated on day 4. In conclusion, the case study suggests that open umbilical cord care can accelerate umbilical cord separation. It is recommended that mothers with newborn babies consider using open umbilical cord care.

Keywords: *newborn baby, care, umbilical cord*