

**Asuhan Keperawatan pada Anak Bronkopneumonia dengan Masalah
Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas di Ruang Flamboyan RSI PKU
Muhammadiyah Pekajangan**

Nadya Oktiani Putri (2018)

Program Studi Diploma III Keperawatan STIKES Muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan

Siti Rofiqoh, M.Kep.,Ns.Sp.Kep.An., Aida Rusmariana, MAN

Abstrak

Prevalensi bronkopneumonia masih tinggi di sejumlah provinsi di Indonesia, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Bronkopneumoni dapat menyebabkan kematian dan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Tujuan studi kasus ini menggambarkan asuhan keperawatan pada anak bronkopneumonia dengan masalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Rancangan studi kasus yang digunakan adalah deskriptif. Dengan subyek studi dua anak balita yang menderita bronkopneumonia dan mengalami ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Studi kasus dilakukan selama tiga hari perawatan pemberian fisioterapi dada. Hasil studi kasus menunjukkan masalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada kedua pasien teratasi. Kesimpulan: fisioterapi dada terbukti efektif untuk meningkatkan kepatenan jalan nafas. Fisioterapi dada dapat dijadikan sebagai salah satu prosedur di Rumah Sakit dalam terapi suportif pada anak yang mengalami ketidakefektifan bersihan jalan nafas akibat bronkopneumonia.

Kata kunci: *bronkopneumonia, fisioterapi dada, ketidakefektifan bersihan jalan nafas*

**Nursing Care in Bronchopneumonia Children the Ineffective Airway
Clearance Problem in Flamboyan Room PKU Muhammadiyah Pekajangan
Hospital**

Nadya Oktiani Putri (2018)
Diploma III Nursing Program STIKES Muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan
Siti Rofiqoh, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An., Aida Rusmariana, MAN

Abstract

The prevalence of bronchopneumoni is still high in some provinces in Indonesia, especially in West Java, East Java and also Central Java. Bronchopneumoni can cause more deaths in infants and can cause respiratory problems. The purpose of this case study describes nursing care in child bronchopneumoni with the inefficiency problem of breathing. Case study design used is descriptive. According to the subjects of two undergraduates who experience bronchopneumoni and experience ineffectiveness reducing the respiratory tract. Case studies are performed during the three-day treatment of chest physiotherapy. The results of the case study highlight the ineffective problem of reducing the airway in both patients. Conclusion: Chest physiotherapy is emphasized to improve the fitness of respiratory tract. Chest physiotherapy can be used as one of the procedures in the hospital in supportive therapy in children who experience ineffective clearance of airway due to bronchopneumoni.

Keywords: bronchopneumoni, chest physiotherapy, innefctive airway clearance