

Penerapan Teknik Posisi Semi Fowler Terhadap Penurunan Sesak Nafas Pada Pasien Tuberculosis Paru

Toni Priyono, Nuniek Nizmah Fajriyah
Program Diploma Tiga Keperawatan
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
Jl. Raya Ambokembang No. 8 Kedungwuni Pekalongan

Abstrak

Tuberculosis paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *mycobacterium tuberculosis* yaitu kuman aerob yang dapat hidup terutama pada bagian paru atau diberbagai organ tubuh lainnya yang mempunyai tekanan parsial oksigen yang tinggi. Tujuan dari studi kasus ini untuk menurunkan sesak nafas pada pasien tuberculosis dengan pemberian posisi semi fowler. Metode yang digunakan yaitu deskriptif untuk membandingkan asuhan keperawatan pada dua pasien tuberculosis paru dengan pemberian terapi posisi semi fowler. Hasil studi kasus ini menunjukan bahwa pasien I dan II terjadi penurunan RR (Respiration Rate) tidak ada retraksi dinding dada. Kesimpulan studi kasus ini bahwa terapi pemberian posisi semi fowler dapat menurunkan sesak nafas pada penyakit tuberculosis dan dapat dilakukan secara mandiri

Kata kunci : Posisi semi fowler, tuberculosis paru

***Application of Semi-Fowler Position Technique to Decrease
Breathlessness in Pulmonary Tuberculosis Patients in Pekalongan
District Court Hospital***

Toni Priyono, Nuniek Nizmah Fajriyah
Study Program Diploma of Nursing Faculty of Health Sciences
Muhammadiyah Pekalongan Pekajangan University
Jl. Raya Ambokembang No. 8 Kedungwuni Pekalongan

Abstract

Pulmonary tuberculosis is an infectious disease caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis, which is an aerobics germ that can live mainly in the lungs or in various other organs of the body that have high oxygen partial pressure. The purpose of this case study is to reduce shortness of breath in tuberculosis patients by giving a semi fowler position. The method used is descriptive to compare nursing care to two pulmonary tuberculosis patients by administering semi-fowler position therapy. The results of this case study showed that patients I and II had a decrease in RR (Respiration Rate), no chest wall retractions. The conclusion of this case study is that semi-fowler position therapy can reduce shortness of breath in tuberculosis and can be done independently

Keywords: pulmonary tuberculosis, Semi fowler position